

Produktai	Infatrini	Infatrini Peptisorb	Nutrini	Nutrini Peptisorb	Nutrini Multi Fibre	Nutrini Energy Multi Fibre	NutriniMax Multi Fibre	NutriKid Multi Fibre
								
Kompensacija	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Indikacijos pagal amžių	0 - 18 mėn.	0 - 18 mėn.	1 - 6 metai	1 - 6 metai	1 - 6 metai	1 - 6 metai	7 - 12 metai	nuo 1 metų
Indikacijos pagal kūno svorį	iki 9 kg	iki 9 kg	iki 8 - 20 kg	iki 8 - 20 kg	iki 8 - 20 kg	iki 8 - 20 kg	iki 21 - 45 kg	
Indikacijos	- Per mažas kūno svoris - Mitybos nepakankamumas - Padidėję organizmo poreikiai maistinėms medžiagoms	- Per mažas kūno svoris - Mitybos nepakankamumas - Padidėję organizmo poreikiai maistinėms medžiagoms - Maisto netoleravimas	- Per mažas kūno svoris - Pooperacinis periodas - Mitybos nepakankamumas - Padidėję organizmo poreikiai maistinėms medžiagoms - Sumažinto skaidulinių medžiagų kiekio dieta	- Per mažas kūno svoris - Pooperacinis periodas - Mitybos nepakankamumas - Padidėję organizmo poreikiai maistinėms medžiagoms - Maisto netoleravimas	- Per mažas kūno svoris - Mitybos nepakankamumas - Padidėję organizmo poreikiai maistinėms medžiagoms - Dietoje yra būtinos maistinės skaidulos (žarnyno motorikos normalizavimui) - Ilgalaikiai enterinės mitybos terapijai	- Per mažas kūno svoris - Mitybos nepakankamumas - Padidėję organizmo poreikiai maistinėms medžiagoms - Būklės, kai yra didesnis energijos poreikis arba būtina apriboti suvartojamo skysčio kiekį - Ilgalaikiai enterinės mitybos terapijai	- Per mažas kūno svoris - Mitybos nepakankamumas - Padidėję organizmo poreikiai maistinėms medžiagoms - Būklės, kai yra būtina apriboti suvartojamo skysčio kiekį - Ilgalaikiai enterinės mitybos terapijai	- Per mažas kūno svoris - Mitybos nepakankamumas - Padidėję organizmo poreikiai maistinėms medžiagoms
100 ml produktų maistinė vertė								
Energinė vertė	100 kcal	100 kcal	100 kcal	100 kcal	101 kcal	151 kcal	102 kcal	153 kcal
Riebalų, g	5,4	5,4	4,4	3,9	4,4	6,7	4,2	6,8
Angliavandenių, g	10,1	10,3	12,5	13,6	12,5	18,5	12,3	18,8
Baltymų, g	2,6	2,6	2,5	2,8	2,5	4,0	3,3	3,3
Skaidulų, g	0,59	sudėtyje nėra	sudėtyje nėra	sudėtyje nėra	0,8	0,8	1,1	1,5
Glitimo, laktozės	Sudėtyje nėra glitimo	Sudėtyje nėra glitimo	Sudėtyje nėra glitimo, laktozės	Sudėtyje nėra glitimo	Sudėtyje nėra glitimo, laktozės	Sudėtyje nėra glitimo, laktozės	Sudėtyje nėra glitimo, laktozės	
Osmoliariškumas, mOsm/l	305	295	200	295	205	315	230	440
Talpa	125 ml	200 ml	200 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	200 ml
 Prebiotiniai oligosacharidai scGOS/lcFOS ir 2'-FL	✓							
 *MF6™ skaidulų mišinys		Be skaidulų	Be skaidulų	Be skaidulų	✓	✓	✓	✓
 Dominuoja išrūgų baltymai	✓	Labai hidrolizuoti išrūgų baltymai	✓	Labai hidrolizuoti išrūgų baltymai	✓	✓	✓	Kazeinas
 Sudėtyje yra LCP**	DHA, AA Sudėtyje yra MCT	EPA, AA Sudėtyje yra MCT	DHA+EPA	Sudėtyje yra MCT	DHA+EPA	DHA+EPA	DHA+EPA	
 Karotenoidai			✓	✓	✓	✓	✓	✓

* MF6™ Multi Fiber patentuotų skaidulų mišinys - palaiko normalią žarnyno veiklą²⁰ (mažina viduriavimo riziką, mažina pilvo putimą, veikia probiotiškai ir kt.)
Sudėtyje yra 6 skirtingų rūšių skaidulos: FOS, akacijų, inulinas, sojos polisacharidai, atsparus krakmolai, celiuliozė.
** Sudėtyje yra ilgų grandinės polinesočiųjų riebalų rūgščių (LCP).
Svarbi informacija! Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Produktas turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams.
Būtina įvertinti visas maitinimo galimybes, įskaitant maitinimą krūtimi.

UAB „Danone“
Lvivo g. 21A, Vilnius 09309, 4a.
Telefonas 880006262
El. paštas: info.lt@danone.com
www.nutricia.lt

KAS GALI SĄLYGOTI AUGIMO PROBLEMAS ANKSTYVOJE VAIKYSTĖJE?

Optimalus augimas ir raida vaikystėje – esminis ilgalaikės sveikatos ir geros savijautos veiksnys. Tačiau yra nemažai priežasčių, kodėl kai kurie vaikai patiria optimalaus augimo problemų. Sulėtėjęs augimas gali būti vaikams, kurie serga sunkiomis ligomis, pavyzdžiui, turi cerebrinį paralyžį, įgimtą širdies ydą, cistinę fibrozę, kepenų ligą ar vėžį^{1,2}. Dar jį dažnai lemia prastas maisto medžiagų pasisavinimas ligos metu ar didesnis maistinių medžiagų poreikis. Be to, augimo problemų gali kilti nesant su ligomis susijusių priežasčių, pavyzdžiui, dėl maitinimo sunkumų³.

Normalų vaikų augimą užtikrina jų mitybos poreikių patenkinimas^{4,5}

Nežiūrint kokia yra sulėtėjusio augimo priežastis, labai svarbu užtikrinti, kad kūdikis ar vaikas gautų pakankamą ir tinkamą mitybą. Skrandžio ir žarnyno problemos, sudėtingas atsigavimas po ligos, padidėjusi infekcijų rizika ir ilga hospitalizacija gali būti susiję su prastu maistinių medžiagų pasisavinimu^{5,6}. Todėl vaiko mitybos maistingumo užtikrinimas ir augimo stebėjimas yra labai svarbūs, siekiant anksti nustatyti, ar vaikai gauna tinkamą mitybą ir, prireikus, ją papildyti, kad būtų užtikrintas tinkamas jų augimas ir raida^{5,6}. „Nutricia“ siūlo platų maisto sprendimų, skirtų specifiniams sveikatos poreikiams tenkinti nuo kūdikystės iki paauglystės ir vėliau, asortimentą. Mūsų tikslas – gerinti sveikatą ilgalaikėje perspektyvoje siūlant kuo įvairesnius mitybos produktus pagal vaiko sveikatos būklę, įskaitant maitinimo sprendimus per burną ar maitinimo zondą. „Nutricia“ enterinių mišinių kūdikiams ir vaikams sudėtyje mes naudojame aukščiausios kokybės maistines medžiagas palaikančias virškinimo ir imuninės sistemos funkcijas.



Kliniškai patvirtintas unikalus prebiotinių oligosacharidų mišinys scGOS/lcFOS (9:1) – maistas gerosioms bakterijoms

- Padeda vystyti sveikai kūdikių žarnyno mikrobiotai ir imuninei sistemai⁷⁻¹³

2'-FL prebiotinis oligosacharidas (2-fukozilaktozė), struktūriškai identiškas 2'-FL motinos pienui

- Veikia kartu su unikaliu prebiotinių oligosacharidų mišiniu scGOS/lcFOS (9:1)¹⁴⁻¹⁶ ir palaiko imuninę sistemą¹⁷⁻¹⁹



MF6™ Multi Fiber patentuotų skaidulų mišinys - palaiko normalią žarnyno veiklą²⁰ (mažina viduriavimo riziką, mažina pilvo putimą, veikia probiotiškai ir kt.)

Sudėtyje yra 6 skirtingų rūšių skaidulų:

- Tirpiosios skaidulos (47 %) – fruktooligosacharidai (FOS), akacijų skaidulos, inulinas
- Netirpiosios skaidulos (53 %) – sojos polisacharidai, atsparus krakmolai, celiuliozė



Sudėtyje yra išrūgų baltymų ir kazeino, santykiu 60:40

- Spartesnis virškinimas ir pasisavinimas vartojant išrūgų baltymais praturtintus mišinius^{21,22}



Sudėtyje yra ilgų grandinės polinesočiųjų riebalų rūgščių (LCP)

- Palaiko optimalų smegenų vystymąsi ir funkciją²³



Sudėtyje yra antioksidantų karotenoidų²⁴

1. Mehta et al. JPN 2013; 37(4):460-481. 2. Beer et al. Nutr Clin Practice 2015;30:609-624. 3. Kerzner et al. PEDIATRICS 2015;135(2). 4. Beer et al. Nutr Clin Practice 2015;30:609-624. 5. Hecht et al. Clin Nutr 2013;34:53-59. 6. Huysentruyt et al. Nutrition 2013;29 1356-1361. 7. Boehm G, et al. Acta Paediatr Suppl. 2003;91(441):64-7. 8. Salminen S, et al. Nutrients. 2020;12(7):1952. 9. Knol J, et al. British Journal of Nutrition. 2005;94:783-90. 10. Moro G, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002;34:291-5. 11. De Kivit S, et al. J Innate Immun. 2013;5(6):625-38. 12. Bruzzese E, et al. Clinical Nutrition. 2009;28:156-61. 13. Knol J, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;36:566-32. 14. Lehmann S, et al. PLoS One. 2015;10(7):e0132304. 15. Overbeek LS, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;68(S1). 16. Salminen S, et al. Eds. The Biotics Family in Early Life. Chichester, UK: John Wiley and Sons Ltd, 2023. 17. Azagra-Boronat I, et al. Front. Immunol. 2019;8(8):876. 18. Xiao L, et al. J Nutr. 2019;149(5):856-69. 19. De Kivit S, et al. J Innate Immun. 2013;5(6):625-38. 20. Guimber, D., Bourgois, B., Beghin, L., Neuville, S., Pernes, P., Amor, K. B., Goedhart, A., Sijben, J., Knol, J., & Gottrand, F. (2010). Effect of multifibre mixture with prebiotic components on bifidobacteria and stool pH in tube-fed children. British Journal of Nutrition, 104(10), 1514-1522. 21. Fried, M. D., Khoshoo, V., Seeke, D. J., Gilday, D. L., Ash, J. M., & Peneharz, P. B. (1992). Decrease in gastric emptying time and episodes of regurgitation in children with spastic quadriplegia fed a whey-based formula. The Journal of Paediatrics, 120(4), 569-572. 22. Brun, A. C., Størdal, K., Johannesdottir, G. B., Bentsen, B. S., & Medhus, A. W. (2012). The effect of protein composition in liquid meals on gastric emptying rate in children with cerebral palsy. Clinical Nutrition, 31(1), 108-112. 23. Sijben, J. W., Goedhart, A. C., Kamphuis, P. J., Calder, P. C., Gottrand, F., & Koletzko, B. (2011). Is it prudent to add n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids to paediatric enteral tube feeding?. Clinical Nutrition, 30(3), 273-281. 24. S. Cooper D.A., Eldridge A.L., Peters J.C. (1999) Dietary carotenoids and certain cancers, heart disease and age-related macular degeneration: A review of recent research. Nutrition Reviews, 1999, 57, 201-214.

ENTERINIŲ MIŠINIŲ KŪDIKIAMS IR VAIKAMS NUO GIMIMO IKI 6 METŲ AMŽIAUS KOMPENSAVIMO TVARKA

- Enterinės mitybos mišiniai skiriami paciento enterinės mitybos terapijai namuose, kai enterinė mitybos terapija yra vienintelis būdas užtikrinti maistinių medžiagų bei energijos poreikius suaugusiesiems ir vaikams, esant TLK-10-AM kodams E40-E43, E45, R13, R63.3 ir turintiems gastrostomą (Z93.1), ileostomą (Z93.2) arba nazogastrinį zondą.
- Enterinės mitybos terapiją namuose pacientui skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios tretinio lygio gastroenterologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas naujagimiams, vaikams ir suaugusiesiems, mitybos terapijos grupės gydytojas dietologas, gydytojas anesteziologas reanimatologas arba vaikų intensyvios terapijos gydytojas, gydytojas gastroenterologas arba gydytojas vaikų gastroenterologas.
- Mitybos terapijos grupės gydytojui enterinius mišinius paskyrus pirmą kartą, vėliau turi teisę tęsti jų skyrimą pagal sudarytą mitybos planą bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas.
- Kas 4 - 6 mėnesius reikalinga gydytojo dietologo pakartotinė konsultacija.

Enteriniai mišiniai kompensuojami 80 % lygmeniu.


DIAGNOZĖ	TLK-10-AM
Kvašiorkoras Didelis mitybos trūkumas su mitybine edema ir odos bei plaukų depigmentacija	E40
Išsekimas dėl prastos mitybos Didelis mitybos trūkumas su išsekimu Išskyrus: kvašiorkorą dėl išsekimo (E42)	E41
Kvašiorkoras dėl išsekimo Didelis baltyminių energetinių medžiagų trūkumas [kaip kategorijoje E43]: • tarpinė forma • su kvašiorkoro ir išsekimo požymiais	E42
Nepatikslintas didelis baltyminių energetinių medžiagų trūkumas Vaikams – didelis svorio kritimas [išsekimas] arba nepakankamas svorio augimas, kai svoris yra mažesnis už palyginamosios populiacijos svorio vidurkį ne mažesne kaip 3 standartinių nuokrypių verte (arba panašus svorio netekimas, paskaičiuotas naudojant kitus statistinius metodus). Jeigu yra tik vieno svorio matavimo duomenų, didelė sunkaus išsekimo tikimybė yra, kai nustatytas svoris 3 statistinių nuokrypių ar didesne verte yra mažesnis už palyginamosios populiacijos vidurkį. Edema dėl badavimo	E43
Sulėtėjusi raida dėl baltyminių energetinių medžiagų trūkumo Dėl mitybos: • mažas ūgis • sustojęs augimas Dėl prastos mitybos sulėtėjusi fizinė raida	E45
Rijimo sutrikimas (disfagija) Sunkumas ryjant	R13
Probleminė ir sutrikusi mityba Mitybos problema, neklasifikuojama kitaip Išskyrus: naujagimių maitinimo problemas (P92) neorganinės kilmės kūdikio maitinimo sutrikimus (F98.2)	R63.3
Gastrostoma, ileostoma	Z93.1, Z93.2
Nazogastrinis zondas	

Nutricia kompensuojamus enterinius mišinius pacientai gali įsigyti vaistinėse su galiojančiu receptu.

ENTERINIŲ MIŠINIŲ PARINKIMO ALGORITMAS

Nutrini

Nuo 1 - 6 metų
(svoris nuo 8 - 20 kg)



MITYBOS REGULIAVIMUI ESANT SU LIGA SUSIJUSIAM MITYBOS NEPAKANKAMUMUI



Nuo gimimo iki 18 mėnesių arba
iki 9 kg kūno masės

Infatrini

Nevalgumas turint valgymo sutrikimų
(pvz., centrinės nervų sistemos ligos)

Didesnis nei jprasta energijas sunaudojimas:

- turint kvėpavimo sutrikimų
- sergant širdies ligomis
- perioperaciniu laikotarpiu

Virškinimo ir/arba absorbcijos sutrikimai:

- virškinimo disfunkcija
- trumpos žarnos sindromas
- cholestazė
- kasos fermentų stygius
- skrandžio ir žarnyno ligos/uždegimai
- didelio kaloringumo polimerinių mišinių netoleravimas: viduriavimas, gastroezofaginis refluksas, vėmimas



Nuo gimimo iki 18 mėnesių arba
iki 9 kg kūno masės

Infatrini Peptisorb

Svarbi informacija! Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Produktas turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Būtina įvertinti visas maitinimo galimybes, įskaitant maitinimą krūtimi.